







Detrito Lampedusa versante nord -46 mt (agosto 2006)

- 1. Trivia arctica
- 2. Emarginula octaviana
- 3. Jujubinus exasperatus forma tricolor
- 4. Jujubinus striatus forma depictus
- 5. Calyptraea chinensis
- 6. Tylodina perversa
- 7. Muricopsis cristatus juveniles
- 8. Vexillum savignyi
- 9. Vexillum ebenus
- 10. Raphitoma linearis
- 11. Cerithium vulgatum juveniles
- 12. Cerithium renovatum juveniles
- 13. Alvania mamillata
- 14. Alvania mamillata
- 15. Tricolia tenuis
- 16. Luria lurida juveniles
- 17. Spondylus gaederopus juveniles
- 18. Nassarius cuvierii juveniles
- 19. Alvania lineata
- 20. Vexillum savignyi
- 21. Rissoa variabilis
- 22. Raphitoma sp.
- 23. Gibbula turbinoides juveniles
- 24. Calliostoma sp. juveniles
- 25. Gibberula sp.
- 26. Lissocpecten hyalinus
- 27. Manupecten pesfelis juveniles
- 28. Clanculus sp. juveniles
- 29. Mitrella sp. juveniles
- 30. Gibbula turbinoides
- 31. Haedropleura secalina
- 32. Rissoa variabilis juveniles
- 33. Haminoea hidatys
- 34. Danilia tinei juveniles
- 35. Metaxia metaxiae
- 36. Fusinus sp. juveniles
- 37. Emarginula punctulum
- 38. Cavolinia tridentata
- 39. Ctena decussata
- 40. Glans trapezia
- 41. Arcopagia balaustina
- 42. Plagiocardium papillosum
- 43. Veneridae juveniles
- 44. Lucinella divaricata
- 45. Loripes lacteus
- 46. Mangelia taeniata
- 47. Rissoa variabilis
- 48. Raphitoma sp.
- 49. Irus irus
- 50. Barbatia barbata juveniles

Nel sedimento sono state determinate anche le seguenti specie, senza produzione di immagini:

- A. Lima lima
- B. Conus mediterraneus
- C. Bolma rugosa juveniles
- D. Gibbula fanulum
- E. Mitromorpha mediterranea
- F. Bittium lacteum
- G. Rissoina bruguieri
- H. Bittium latreilli
- I. Colubraria reticulata juveniles
- J. Mimachlamys varia
- K. Cavolinia inflexa
- L. Williamia gussoni
- M. Smaragdia viridis
- N. Euspira pulchella juveniles